

Clotrimazolum Aflofarm, 10 mg/g, krem, **Skład**: 1 g kremu zawiera 10 mg klotrymazolu (*Clotrimazolum*).
Substancje pomocnicze o znanym działaniu: alkohol cetylowy, alkohol stearylowy. 1 g kremu zawiera 10 mg alkoholu benzylowego. **Wskazania do stosowania**: Kandydozy skóry i błon śluzowych zewnętrznych narządów płciowych, grzybice powierzchniowe skóry spowodowane przez dermatofity: *Trichophyton rubrum*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Epidermophyton floccosum*, *Microsporum canis*: grzybice stóp (*tinea pedis*), pachwin (*tinea cruris*), ciała (*tinea corporis*), międzypalcowe (*tinea interdigitalis*), grzybica stóp z wtórnym zakażeniem, np. grzybica stóp u sportowców. Łupież pstry (*tinea versicolor*) wywołany przez *Mallassezia furfur*. **Dawkowanie i sposób podawania**: Dawkowanie Nakładać cienką warstwę produktu leczniczego na chorą powierzchnię skóry i przylegający obszar dwa razy na dobę: rano i wieczorem. Stosować nie krócej niż przez 4 tygodnie. Ostre objawy choroby ustępują mniej więcej po tygodniu stosowania produktu. Terapia zakażeń grzybiczych błon śluzowych zewnętrznych narządów płciowych powinna trwać od tygodnia do dwóch tygodni. *Dzieci, pacjenci w podeszłym wieku* Dzieci w wieku poniżej 11 lat i osoby w podeszłym wieku mogą stosować produkt leczniczy tylko na zalecenie lekarza. Sposób podawania Produkt leczniczy przeznaczony do stosowania miejscowego. **Przeciwwskazania**: Nadwrażliwość na klotrymazol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Dzieci w wieku poniżej 11 lat. Niewydolność nerek. I trymestr ciąży. Stosowanie produktu leczniczego: dopochwowo i do oczu. **Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania**: Brak poprawy po 4 tygodniach stosowania klotrymazolu lub wcześniejsze zaostrzenie objawów choroby jest wskazaniem do przerwania stosowania produktu i wykonania badań mikrobiologicznych, w celu prawidłowego określenia przyczyny choroby. Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 11 lat i osób w podeszłym wieku jest możliwe jedynie na zlecenie i pod kontrolą lekarza. Pacjenci leczenia immunosupresyjnego, poddani chemoterapii, diabetycy oraz zakażeni wirusem HIV powinni skonsultować stosowanie produktu leczniczego z lekarzem. Kobiety ciężarne i karmiące piersią nie powinny stosować klotrymazolu bez porozumienia z lekarzem. Możliwe jest występowanie krzyżowej nadwrażliwości klotrymazolu z innymi pochodnymi azolowymi o działaniu przeciwgrzybiczym takimi jak: itraconazol, flukonazol, ketokonazol, mikonazol. Specjalne ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych **Alkohol cetylowy, alkohol stearylowy** Produkt leczniczy może powodować miejscową reakcję skórą (np. kontaktowe zapalenie skóry). **Alkohol benzylowy** Produkt leczniczy zawiera 10 mg alkoholu benzylowego w każdym gramie kremu. Alkohol benzylowy może powodować reakcje alergiczne lub łagodne miejscowe podrażnienie. **Działania niepożądane**: Niekiedy mogą pojawiać się objawy podrażnienia ze strony skóry takie jak: rumień, wysypka, pokrzywka, miejscowe zaczerwienienie, swędzenie, wystąpienie pryszczy, obrzęk lub inne objawy miejscowej nietolerancji produktu oraz ogólne reakcje nadwrażliwości. Tego typu uciążliwe reakcje są podstawą do przerwania terapii. Działania niepożądane mogą być wywołane przez zawarty w produkcie środek konserwujący alkohol benzylowy. **Podmiot odpowiedzialny**: Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice. **Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu**: 9053. Wydane przez: Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. **Lek OTC**.