1 mm

1,5 mm

0,5 mm

124

120 mm

Revaxil

Tuba 30 g

hydrożel

Skład

Wyrób zawiera 15% Osmo 4 (glikol oktylenowy, glikol polietylenowy, glicerol, karbomer, woda oczyszczona) oraz karbomer, wodorotlenek sodu i wodę oczyszczoną.

Ilościowy skład Osmo 4: glikol oktylenowy: 3.5-6.5%, glikol polietylenowy: 18-28%, glicerol: 35-55%, karbomer: 0.80-0.85%, woda oczyszczona: do 100%

Wskazania

Leczenie i łagodzenie oparzeń powierzchownych I° i II° (ból, zaczerwienienie i pojawianie się pęcherzy na ograniczonej powierzchni): oparzenia domowe, oparzenia słoneczne. Łagodzenie miejscowych objawów zapalnych skóry powstałych w wyniku skaleczeń, otarć, zadrapań. Dla dorosłych i dzieci od 1 dnia życia.

Działanie

Revaxil jest hydrożelem opartym na bazie fizycznej aktywności osmotycznej, który:
- łagodzi ból (szybko chłodzi tkanki skóry, łagodzi i ogranicza rozprzestrzenianie się rany)
- zmniejsza zapalenia skórne
- pomaga uniknąć infekcji
- ponownie nawadnia powierzchowne warstwy skóry i wspomaga gojenie się uszkodzeń skóry
- zmniejsza obrzęki

Sposób użycia

Nanieść Revaxil na całą oparzoną powierzchnię skóry, lekko wmasowując. Pozostawić do wchłonięcia. Powtarzać 2 do 3 razy dziennie.

Przeciwwskazania

Otwarte rany. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników wyrobu.

Aflofarm

160 mm

124

124

120 mm

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Tylko do użytku zewnętrznego na skórę. Unikać kontaktu z oczami. Podczas nanoszenia wyrobu może towarzyszyć uczucie ściągania. Nie stosować wyrobu w połączeniu z innymi produktami o podobnym zastosowaniu. Należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiednich warunków przechowywania wyrobu. Nie stosować wyrobu po upływie daty ważności. Wszelkie niewykorzystane resztki wyrobu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami. W razie nadwrażliwości należy skonsultować się z lekarzem. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na adres wskazany na stronie www.urpl.gov.pl.

Warunki przechowywania

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

+15°C +25°C

Po otwarciu opakowania okres ważności nie ulega zmianie, pod warunkiem, że po każdorazowym użyciu wyrobu opakowanie jest ponownie szczelnie zamykane.

Data wydania instrukcji używania: 13.01.2026, wersja 2

CE 2274 MD osmo4

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 133/151

Wyjaśnienie symboli użytych na opakowaniu:

LOT - nr serii

- termin ważności

- zajrzyj do instrukcji używania

+15°C +25°C - ograniczenie dopuszczalnych temperatur przechowywania

- producent

MD - wyrób medyczny

Aflofarm

160 mm

124